

33 мин +





Хирургия 9

👁 **СИНДРОМ РЭЙНАУДА** – сужение кровеносных сосудов пальцев рук и/или ног

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку. Лечите только пораженную сторону, но начинайте всегда с точки 1. Если поражены обе стороны, воздействуйте на точку 1 только **ОДИН** раз.

НО.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	5 мин
2	Надключичная ямка	50 Гц	1 мин на точку
3	Подключичная ямка		
4	Подмышечная ямка		
5	Середина плеча с внутренней стороны		
6	Локтевая ямка		
7	Лучевая артерия		
8	Сканируйте пальцы со стороны ладони	1000 Гц	2 мин на палец
9	Сканируйте пальцы с тыльной стороны руки	1000 Гц	2 мин на палец
<i>Повторите 8 и 9 для пальцев ног в случае необходимости</i>			
10	Сканируйте вдоль позвоночника со стороны повреждения	1000 Гц	2 мин

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день на протяжении 15 дней. После этого перерыв на 2-3 недели перед тем, как проводить следующий курс. Затем продолжайте до полного выздоровления. **Повторяйте дважды в год** для поддержания благополучия.

