

1 час



Аутоиммунная 3

- ТИРЕОИДИТ ХАСИМОТО (ЗОб ХАСИМОТО)
- ТИРЕОИДИТ ОРДА
- ГИПЕРТИРЕОИДИЗМ (ПОВЫШЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)
- ГИПОТИРЕОИДИЗМ (ПОНИЖЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)
- ТИРЕОТОКСИКОЗ

ПРОЦЕДУРА А (РАННЕЕ УТРО)

Общая 3 (кровь)


Делайте **один раз в день**.

ПРОЦЕДУРА Б (ВЕЧЕР)

Используйте **медицинскую насадку**. **Ультразвук** должен быть **ВЫКЛЮЧЕН**  для точек 1, 2, 3 и 4.

НО.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Лобная кость (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
2	Виски (оба) 	50 Гц	1 мин на сторону
3	Теменная зона (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
4	Подзатылочная зона (обе стороны) 	50 Гц	1 мин на сторону
5	Щитовидная железа	50 Гц	2 мин на точку
6	Надключичные ямки	5 Гц	1 мин на точку
7	Подключичные ямки	5 Гц	1 мин на точку

Продолжение через страницу 



NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
8	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	2 мин
9	Солнечное сплетение	50 Гц	2 мин
10	Селезенка	5 Гц	2 мин на точку
11	8 точек от копчика до затылка с интервалами в 10 см	1000 Гц	1 мин на точку
12	Надпочечники	5 Гц	2 мин на точку
13	Селезенка	5 Гц	2 мин на точку
14	Сканируйте обе стороны позвоночника с тыльной стороны шеи	1000 Гц	5 мин на сторону

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Проводите вышеописанный курс процедур **каждый день без каких-либо перерывов**, пока не будет достигнуто **заметное улучшение**. После этого **перерыв на 2 недели**, затем **следующий** курс процедур и снова перерыв на 2 недели. Повторяйте весь этот цикл до полного выздоровления.

